

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS
PRIMERA EVALUACION DE DIETOTERAPIA

NOMBRE:

FECHA:

Conteste de manera clara las preguntas; ponga una x en la opción que usted considere correcta o complete en el caso de ser necesario. Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos. Puntuación total de la evaluación 100 puntos.

1.- Escriba las jerarquías de la dietoterapia y ponga un ejemplo de cada una

2.- Qué aspectos se debe considerar en las dietas terapéuticas?

3.- Señale la opción que no corresponde

La prescripción dietética permite:

() indica las características cuantitativas que debe tener una alimentación

() debe ser grupal

() dinámica

4.- Cómo se formula una prescripción?

5.- Dicotomizada con fin terapéutico

() ley de calidad

() ley de la adecuación

() ley de armonía

() ley de cantidad

6.- Cuáles son las bases generales que se deben cumplir para toda prescripción?

7.- Cuáles son los postulados de la prescripción?

8.- Escriba cuál es la utilidad de la fórmula sintética?

9.-Cuál es la clasificación de los regímenes de alimentación?

10.- Escriba las características de la dieta líquida

11.- Qué indicaciones se deben dar para una dieta líquida completa estandar?

12.- Escriba los tipos de dietas

13.- En la dieta basal hospitalaria

() 1800 a 2000 calorías, 80 a 85 gramos de proteína

() 1800 a 2200 calorías, 60 a 65 gramos de proteína

() 1800 a 2000 calorías, 65 a 75 gramos de proteína

() 1800 a 2200, 65 a 75 gramos de proteína

14.- Escriba cuáles son las dietas con textura modificada

15.- completo en su composición para ofrecer al organismo, unidad invisible, todas las sustancias que lo integran

() ley de cantidad

() ley de armonía

() ley de calidad

() ley de adecuación

16.- Escriba 5 dietas terapéuticas

17.- Escriba sobre la diarrea osmótica

18.- Escriba sobre la dieta esteatorreica

19.- Cómo se prepara la limonada alcalina?

20.- en la dieta basal hiposódica

() en casos severos: < 100 mg

() en casos severos: > 100 mg

() en casos severos: < 1000 mg

() en casos severos: > 1000 mg