



## SOLUCIÓN

### Pregunta 1 (2 puntos)

Un grifo de agua que gotea deja caer constantemente gotas cada 1.0 s. Conforme dichas gotas caen, ¿la distancia entre ellas aumenta, disminuye o permanece igual? Justifique su respuesta.

Todas las gotas, al salir del grifo aceleran a  $9.8 \text{ m/s}^2$ , pero las primeras tienen más tiempo aceleradas por lo que gozan de más rapidez y recorren mayor distancia en el mismo tiempo. La distancia entre ellas **aumenta**.

### Pregunta 2 (2 puntos)

Si las fuerzas externas que actúan sobre un sistema no generan trabajo, ¿qué puede decir del sistema?

El trabajo de las **fuerzas internas** puede hacer variar la energía cinética del sistema. Si **las fuerzas internas son conservativas se conserva la energía mecánica del sistema**.

### Pregunta 3 (2 puntos)

En un choque completamente inelástico, ¿cómo se podría hacer, si es posible, para que la energía cinética final del sistema sea cero? Si la energía cinética del sistema antes del choque fue diferente de cero, ¿qué pasó con la energía cinética?

Para que la energía cinética final del sistema sea cero los objetos, luego de la colisión, **deben quedar en reposo**. Durante la colisión se hizo trabajo que **transformó** la energía cinética en otro tipo de energía, por ejemplo energía térmica.


### Pregunta 4 (4 puntos)

Se lanza una piedra hacia el aire con un ángulo  $\theta < 90^\circ$  por encima de la horizontal, y se desprecia la resistencia del aire. Construya una gráfica que describa lo mejor posible la *rapidez*  $v$  de la piedra en función del tiempo  $t$  mientras está en el aire.

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2$$

$$v^2 = (v_0 \cos \theta)^2 + (v_0 \sin \theta - gt)^2$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 \sin \theta gt + g^2 t^2}$$



**Pregunta 5 (4 puntos)**

Un cartón de 1.5 kg desciende en un ascensor a 5 m/s. Un libro de física de 1.5 kg es arrastrado por el piso a 5 m/s. Un melón de 1.5 kg se desplaza con componente vertical de velocidad de 3 m/s y componente horizontal de 4 m/s. ¿Tienen estos cuerpos la misma velocidad? ¿Tienen estos cuerpos la misma cantidad de movimiento? ¿Tienen estos cuerpos la misma energía cinética? Justifique sus respuestas.

La velocidad es **distinta** pues tienen diferentes direcciones.


La cantidad de movimiento es **diferente** pues siempre tiene siempre la misma dirección que la velocidad.

La energía cinética es la **misma**, pues sólo depende de la rapidez de los cuerpos (y su masa)

**Pregunta 6 (4 puntos)**


Cuando un cuerpo que oscila en un resorte horizontal pasa por su posición de equilibrio, su aceleración es cero. Cuando la partícula de un péndulo oscilatorio simple pasa por su posición de equilibrio, ¿su aceleración también es cero? Explique

**No**, pues al estar en una trayectoria circular estará sometido a una aceleración centrípeta.



### Ejercicio 1 (15 puntos)

Se usa un dispositivo similar a una rueda de bicicleta que puede girar alrededor de un eje fijo. Se enrollan cuerdas de las que penden dos objetos de masas  $m_1 = 300 \text{ g}$  y  $m_2 = 200 \text{ g}$  tal como se muestra en la figura. Se sabe que  $m_1$  tarda  $0.90 \text{ s}$  en recorrer la altura  $h_1 = 1.00 \text{ m}$ , partiendo del reposo. Conociendo además que el radio exterior de la rueda es  $30 \text{ cm}$  y el radio interior es  $10 \text{ cm}$ , determine:



- a) la altura que asciende  $m_2$  en el instante que  $m_1$  recorre la distancia  $h_1$  (3 puntos)

El desplazamiento angular de la rueda es el mismo para todos sus puntos:

$$\frac{h_1}{R} = \frac{h_2}{r} \Rightarrow h_2 = \frac{r}{R} h_1 = 0.33 \text{ m}$$

- b) la aceleración angular de la rueda (3 puntos)

$$h_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2 = \frac{1}{2} \alpha R t^2 \Rightarrow \alpha = \frac{2h_1}{R t^2} = 8.23 \text{ rad/s}^2$$

- c) La aceleración de cada bloque (3 puntos)

$$a_1 = \alpha R = 2.47 \text{ m/s}^2$$

$$a_2 = \alpha r = 0.82 \text{ m/s}^2$$

- d) la tensión en cada cuerda (3 puntos)

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \Rightarrow T_1 = 2.20 \text{ N}$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \Rightarrow T_2 = 2.12 \text{ N}$$

- e) el momento de inercia de la rueda (3 puntos)

$$T_1 R - T_2 r = I \alpha \Rightarrow I = 5.44 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

### Ejercicio 2 (12 puntos)

Un cuerpo celeste posee una masa de  $7.35 \times 10^{22}$  kg y un radio de  $1.74 \times 10^6$  m. Un satélite de  $5.00 \times 10^3$  kg de masa gira a su alrededor a lo largo de una trayectoria circular con radio igual a  $8.70 \times 10^6$  m. Determinar:

a) El periodo orbital del satélite (3 puntos)

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 (8.7 \times 10^6)^3}{(6.67 \times 10^{-11})(7.35 \times 10^{22})}} = 7.28 \times 10^4 \text{ s}$$

b) La energía total del satélite. (2 puntos)

$$E = -\frac{GMm}{2r} = -\frac{(6.67 \times 10^{-11})(7.35 \times 10^{22})(5.00 \times 10^3)}{2(8.7 \times 10^6)} = -1.41 \times 10^9 \text{ J}$$

c) El trabajo que deben efectuar los motores del satélite para llevarlo a una órbita circular de  $12.0 \times 10^6$  m de radio? (4 puntos)


$$W = E_2 - E_1 = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(7.35 \times 10^{22})(5.00 \times 10^3)}{2} \left[ -\frac{1}{12.0 \times 10^6} + \frac{1}{8.7 \times 10^6} \right] = 3.87 \times 10^8 \text{ J}$$

d) La velocidad de escape desde el cuerpo celeste (3 puntos)


$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{\frac{2(6.67 \times 10^{-11})(7.35 \times 10^{22})}{1.74 \times 10^6}} = 2.37 \text{ km/s}$$

### Ejercicio 3 (15 puntos)

Un disco uniforme de masa  $M = 9.0 \text{ kg}$  y radio  $r = 10 \text{ cm}$  puede rodar sin deslizarse sobre una pendiente y está unido a un resorte AB, de constante elástica  $K = 750 \text{ N/m}$  como indica la figura. El centro del disco se mueve  $1.25 \text{ cm}$  hacia abajo por la pendiente desde la posición de equilibrio y luego se le suelta desde el reposo.  $I_{cm} = \frac{1}{2}Mr^2$



- a) Realice el diagrama de cuerpo libre del disco (3 puntos)



$X_0 =$  deformación del resorte en la posición de equilibrio

- b) Plantee la segunda ley de Newton, de traslación y rotación, del disco cuando el resorte está deformado una distancia  $X$  (3 puntos)

Rotación Pura:

$$\sum \tau_{c.m.} = I_{c.m.} \alpha$$

$$-f_R * r = \frac{1}{2} Mr^2 \alpha$$

$$-f_R = \frac{1}{2} M(r\alpha)$$


$$-f_R = \frac{1}{2} Ma_{c.m.} \quad (1)$$

Traslación Pura:

$$\sum F = Ma_{c.m.}$$

$$-K(X_0 + X) + Mg \text{Sen} \phi + f_R = Ma_{c.m.} \quad (2)$$

c) Demuestre que el disco tiene un movimiento oscilatorio armónico simple (3 puntos)



En la posición de equilibrio:

$$\sum F_X = 0$$

$$KX_0 = Mg \text{ Sen} \phi \quad (3)$$

Combinando (1), (2) y (3):

$$\frac{d^2 X}{dt^2} + \frac{2 K}{3 M} X = 0$$

que es la ecuación del movimiento armónico simple

d) Determine el período de oscilación (3 puntos)

Con:  $\omega = \sqrt{\frac{2 K}{3 M}}$  y por lo tanto

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{3 M}{2 K}} = 2\pi \sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{9.0}{750}} = 843 \text{ ms}$$

e) ¿Cuál es la velocidad máxima del centro de masa del disco? (3 puntos)

$$v_{\text{máx}} = A\omega = X_{\text{máx}} (2\pi/T) = 9.32 \text{ cm/s}$$